



# กรอบการใช้ยาสัมนไพรทดแทน

## จังหวัดอุทัยธานี

พื้นที่ภูมิภาค

ใช้ทดแทน

Antibiotic Amoxicillin

ข้อบ่งใช้

การใช้ยา

เจ็บคอ

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 2 กรัม

ไข้หวัดที่ไม่ได้ติดเชื้อ

วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร

และก่อนนอน

ระยะเวลา ใช้ติดต่อกันไม่เกิน 3-5 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์

ข้อห้ามใช้

สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร

### ข้อควรระวัง

- การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้แขนขาเมื่ำอาการชา/อ่อนแรง
- ระวังการใช้ร่วมกับ anticoagulants และ antiplatelets
- การใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราจะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
- การใช้ร่วมกับยาที่ metabolism ผ่านเอนไซม์ CYP 450 เนื่องจากพื้นที่ภูมิภาค  
มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP 2C9 และ CYP3A4
- อาจมีอาการปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เปื้ออาหาร วิงเวียน  
ใจสั่น และเกิดลมพิษ



## ขั้นตอน

ใช้ทัดแทน Simethicone, sodamint tab, mix carminative



### ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด

ห้องอีด ห้องเฟื้อ

### การใช้ยา

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม

วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

ระยะเวลา



ใช้ติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน

### ข้อควรระวัง

- ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี สตรีมีครรภ์ และเด็ก
- ระวังการใช้ร่วมกับ anticoagulants และ antiplatelets
- การใช้ร่วมกับยาที่ metabolism ผ่านเอนไซม์ CYP 450 เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้น CYP 2A6
- การใช้ร่วมกับยา抗癌药 คอมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin  
เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ของยา

## มะขามแขก

ใช้ทัดแทน

Bisacodyl



### ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องผูก

### การใช้ยา

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-1.5 กรัม

ตามอาการก่อนนอน

ระยะเวลา



ใช้เมื่อมีอาการ หรือใช้ติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน

### ข้อควรระวัง

- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือผู้ป่วย inflammatory bowel disease
- การรับประทานยาในขนาดสูง อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
- ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ลำไส้ใหญ่ชันต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย
- ระมัดระวังการใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
- อาจมีอาการปวดวนท้อง ผื่นคัน

### ข้อห้ามใช้

- ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
- สตรีมีครรภ์ (Pregnancy catX)

## เกาลี่ย์เปรี้ยง



### ใช้ทดแทน

#### ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ

ขับปัสสาวะ

### NSAIDs

#### การใช้ยา

ผู้ใหญ่ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม

วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที

ดื่มน้ำตามมากๆ

ระยะเวลา



รับประทานติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน

#### ข้อควรระวัง

- การใช้กับผู้ป่วย peptic ulcer เนื่องจากมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนยาในกลุ่ม NSAIDs
- อาจทำให้ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอบแห้ง ใจสั่น

## ยาเหลืองปิดสมุนไพร



### ใช้ทดแทน

#### ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่ได้

เกิดจากการติดเชื้อ หรือมีการ

ถ่ายท้องหลายครั้งติดต่อกัน

### Loperamide

#### การใช้ยา

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 5 ชั่วโมง

เมื่อมีอาการ

ระยะเวลา



ใช้เมื่อมีอาการและไม่เกิน 1 วัน

#### ข้อควรระวัง

ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

## ยาธาตุบรรจุบ



### ใช้ทดแทน

#### ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุก

เสียด แน่นท้อง และอาการท้องเสีย

ที่มีลมในทางเดินลำไส้ร่วมด้วย

### Mix Carminative

#### การใช้ยา

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง

ก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ

ระยะเวลา



สำหรับอาการท้องอืดท้องเฟ้อใช้ติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน

สำหรับอาการท้องเสียใช้เมื่อมีอาการไม่เกิน 1 วัน

#### ข้อห้ามใช้

สตรีมีครรภ์  
และผู้ที่มีไข้

#### ข้อควรระวัง



- การใช้ยาร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- การใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ

ตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

## ยาผสุนเพชรลังกาต สูตร 2



### ใช้ทดแทน

Draflon, siduol

#### ข้อบ่งใช้

รักษาเรื้อรังทั่วไป

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 500 มิลลิกรัม-1 กรัม

3-4 ครั้งหลังอาหาร

ระยะเวลา



รับประทานติดต่อกัน 7 วัน แล้วติดตามอาการ

#### ข้อควรระวัง

อาจมีอาการ ท้องผูก ท้องเสีย ปวดศีรษะ ห้องอีดไฟฟ้า คลื่นไส้ อาเจียน

## ชาชงรากจืด



#### ข้อบ่งใช้

ถอนพิษพิតสำแดง พิษเบื้องมา

รับประทานครั้งละ 1 ซองเล็ก/วัน

ถอนพิษอื่นๆ ถอนพิษไข้

ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร

แก้ร้อนใน

วันละ 3 ครั้ง (1 ซองเล็กใช้ชงได้

2-3 ครั้ง/วัน) ก่อนอาหารหรือเมื่อมีอาการ

ระยะเวลา



รับประทานติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน และ ต้องนัดมาเจาะเลือด查

#### ข้อควรระวัง

1. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการ

2. ผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

## ชาชงหญ้าดอกข้าว



### ใช้ทดแทน

Nortriptyline

#### ข้อบ่งใช้

ลดความอยากบุหรี่

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ซองเล็ก/วัน ชงน้ำร้อน

ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร

หลังอาหาร วันละ 3 - 4 ครั้ง

(1 ซองเล็กใช้ชงได้ 2-3 ครั้ง/วัน)

#### ข้อควรระวัง

## ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต

เนื่องจากยาหญ้าดอกข้าวมีโพแทสเซียมสูง  
อาจทำให้เกิดอาการปากแห้ง คอแห้ง

ระยะเวลา → รับประทานติดต่อกัน 14 วัน แล้วนัดมาเจาะเลือด查  
ดูอาการ ถ้าอาการดีขึ้นรับยาต่อเนื่องแล้ว  
นัดมาดูอาการ 1 เดือนและ 2 เดือน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก